

CT 造影検査を受けられる方へ

CT 検査ではエックス線により得た画像情報をコンピューターにより画像化し、各部位を詳細な画像により診断する検査です。検査は、30分程度の時間で終わります。また、部位により数回 10 秒程度息を止めていただきますがご了承ください。

・検査時間

予約時間に再来機で手続きを行い予約票、受付票を持って放射線科受付までお越しください。入院中の方は、CT室より連絡があるまでお部屋でお待ちください。

・検査当日の食事について

- 食事制限はありません [水分摂取の（お茶、水）制限はありません。]
- 検査当日の朝食のみ絶食となります。
- 検査当日の昼食のみ絶食となります。

・検査前の蓄尿の必要性について

- 蓄尿の必要はありません。
- 蓄尿してください。

予約時間の約 2 時間前からトイレは控えて膀胱内に尿をためてください。

・持ち物及びお身体について

下記の物は検査部位により検査の妨げになりますので、検査前にはずしていただきます。ご了承ください。

金属のホック・ファスナーなどのついた下着類装飾品（時計、ネックレス、ピアス、イヤリング、指輪など）補聴器、ヘアピン、めがね、取り外し可能な入れ歯、コンタクトレンズ、カイロ、シップ、エシキバンなど

・お願い

緊急患者さんやその他検査の都合上時間が多少ずれることがあります。ご了承ください。エックス線を使い検査します。体内・体外に金属や精密機械があると検査できないことがあります。以下の方は検査前に申し出てください。

- ・心臓ペースメーカー装着している。
- ・妊娠または妊娠の可能性がある。

ビグアイド類糖尿病治療薬を使用している方が

(基本名 メルビン・ジベトス 下記参照)

ヨード系造影剤を使ってCTの検査を施行する場合

- ① 造影検査前の血清クレアチニン値の測定を検査実施日から3ヶ月以内に行われていない方
 - ② 検査前にビグアイド類糖尿病治療薬(下記該当薬品)の服用を中止していない方
- ①, ②に該当する方は造影検査を施行できません。下記要項をご確認のうえ実施してください。

ビグアイド類糖尿病治療薬の服用を一時中止する場合、造影検査実施日の前後計5日間(検査当日前2日間、後3日間)服用中止してください。

【理由】

造影剤腎症はヨード造影剤の使用により引き起こされることが知られており、造影剤使用患者の1~6%ハイリスク群で41%の方に発症するともいわれています。ヨード造影剤とビグアイド類糖尿病治療薬の併用は乳酸アシドーシスが発症する危険性があり、添付文章上で慎重投与となっています。これはヨード造影剤の使用により腎機能が低下した場合ビグアイド類糖尿病治療薬の排泄が遅延することにより発症すると考えられています。下記薬剤が現在該当薬品です。

一般名：塩酸メトホルミン

[代表薬]

メタクト配合錠 HD ・ LD	(武田薬品)
グリコラン錠	(日本新薬)
メトグルコ錠	(大日本住友)
メデット錠	(トーアエイヨー、アステラス)
ネルビス錠	(三和化学)
メトリオン錠	(シオノ、ケミファ、大洋)
メトホルミン塩酸塩錠「トーワ」	(東和薬品)
メトホルミン塩酸塩錠「JG」	(日本ジェネリック)

一般名：塩酸ブホルミン

[代表薬]

ジベトス錠	(日医工)
ジベトンS錠	(寿、ゼリア)
塩酸ブホルミン錠 「ミタ」	(キョウリンメディオ)

CT 造影検査を受けられる方へ

造影検査について

CT 検査ではエックス線により得た画像情報をコンピューターにより画像化し、各部位を詳細な画像により診断する検査です。検査は、30分程度の時間で終わります。また、部位により数回 10 秒程度息を止めていただきますがご了承ください。造影検査とは、ヨードを含んだ薬を静脈から注射します。造影剤を使用することで病変の描出がよくなり診断に大変役立ちます。

・副作用について

造影剤を使用すると、下記のような副作用が起こる場合があります。

・軽い副作用

吐き気、動悸、頭痛、かゆみ、発疹などです。基本的に治療を要しないことが多いです。この副作用の起こる確率は、約5%で 100 人につき5人です。

・重い副作用

呼吸困難、意識障害、血圧低下、腎機能低下などです。

このような副作用は、通常治療が必要できわめてまれですが、後遺症として残る可能性があります。そのため、入院や治療が必要なこともあります。このような副作用が起こる確率は約 0.1%以下で 1000 人に 1 人以下です。

・重篤な副作用

病状・体質によっては約 20 万人～40 万人に 1 人の割合（0.0005～0.00025%）で死亡する場合があります。

*造影剤は血管外に漏れでることもあります。この場合は、注射した部分が腫れたり、痛みを伴うこともあります。時間がたてば吸収されるので心配はありません。漏れた量が非常に多い場合には皮膚科での処置が必要になることもあります。

ご注意いただきたいこと

・喘息、甲状腺機能亢進症、ヨードアレルギー、その他アレルギー体質の方、一部糖尿病治療薬を使用している方は造影剤を使用できない場合があります。（別紙参照）上記の病気で現在常用されているお薬があれば、確認のためご持参ください。

・難聴の方、お身体の不自由な方、妊娠の可能性のある方、当日体調の悪い場合は検査前にお申し出下さい。

検査 1～3 日後、アレルギー反応が出る場合があります。身体に異常を感じられた時には主治医にご相談下さい。

造影 CT 検査に関する同意書

市立芦屋病院 病院長 様

記

造影検査についての説明内容

- 現在の病状や予後について
- 造影剤使用の必要性と危険性(副作用、合併症)の可能性
- 造影剤を使用しない場合の利益および不利益
- 代替の検査法
- セカンドオピニオンを保証すること
- 実施前であれば、同意を取り消すことができる
- 当日、検査担当医の判断により造影剤を使用しないことがあること
- 造影剤の使用を希望しない場合(造影剤を使用せずに検査を行う場合):

造影剤の使用を希望しない場合は、署名欄に自筆署名または記名押印をしてください。

年 月 日

署名:

続柄()

(代理人の場合は続柄をご記入下さい)

説明医師名:

印

同席者氏名:

印

同意説明日:

印

私は、別紙説明文に基づく、上記の造影検査についての必要性及び実施内容の説明を十分に理解しましたので同意いたします。

年 月 日

現住所:

氏名:

署名:

または、代理人住所:

代理人氏名:

続柄()

造影 CT 検査に関する同意書

市立芦屋病院 病院長 様

記

造影検査についての説明内容

- 現在の病状や予後について
- 造影剤使用の必要性と危険性(副作用、合併症)の可能性
- 造影剤を使用しない場合の利益および不利益
- 代替の検査法
- セカンドオピニオンを保証すること
- 実施前であれば、同意を取り消すことができる
- 当日、検査担当医の判断により造影剤を使用しないことがあること
- 造影剤の使用を希望しない場合(造影剤を使用せずに検査を行う場合):

造影剤の使用を希望しない場合は、署名欄に自筆署名または記名押印をしてください。

年 月 日

署名:

続柄()

(代理人の場合は続柄をご記入下さい)

説明医師名:

印

同席者氏名:

印

同意説明日:

印

私は、別紙説明文に基づく、上記の造影検査についての必要性及び実施内容の説明を十分に理解しましたので同意いたします。

年 月 日

現住所:

氏名:

署名:

または、代理人住所:

代理人氏名:

続柄()

